
Methods

District selection

fi

fl

®

fi

Survey implementation

Survey results

fi

Table 3 Coverage of mothers ($n=312$) and women of childbearing age ($n=312$) with tetanus toxoid (TT) in Gao district, Mali, 2007
 Tableau 3 Couverture des mères ($n=312$) et des femmes en âge de procréer ($n=312$) par l'anatoxine tétanique (VAT) dans le district de Gao, Mali, 2007

		Percentage – Pourcentage	95% confidence interval – Intervalle de confiance à 95%
Mothers with cards – Mères ayant une carte de vaccination		35.9	28.8 – 43.0
Card only – Carte seulement	TT1–VAT1	35.9	28.8 – 43.0
	TT2–VAT2	25.6	20.0 – 31.3
	TT3–VAT3	16.0	10.9 – 21.2
	TT4–VAT4	6.1	3.0 – 9.2
	TT5–VAT5	3.5	1.0 – 6.0
Card and history – Carte et antécédents	TT1–VAT1	63.5	56.8 – 70.2
	TT2–VAT2	50.6	43.6 – 57.7
	TT3–VAT3	33.3	26.9 – 39.8
	TT4–VAT4	11.5	7.4 – 15.7
	TT5–VAT5	6.4	3.2 – 9.6
Women of childbearing age with cards – Femmes en âge de procréer ayant une carte de vaccination		32.7	26.4 – 39.0
Card only – Carte seulement	TT1–VAT1	32.7	26.4 – 39.0
	TT2–VAT2	30.1	23.5 – 36.8
	TT3–VAT3	17.3	12.2 – 22.4
	TT4–VAT4	6.4	3.4 – 9.4
	TT5–VAT5	2.9	1.1 – 4.7
Card and history – Carte et antécédents	TT1–VAT1	56.7	49.2 – 64.2
	TT2–VAT2	51.3	43.5 – 59.1
	TT3–VAT3	34.6	27.6 – 41.6
	TT4–VAT4	12.5	8.5 – 16.5
	TT5–VAT5	6.1	3.2 – 9.0

Table 3

et 2
Tableau 3

n

Editorial note.

®

fi

fi

fi

fi

Onchocercose (cécité des rivières)

**Rapport de la Seizième Conférence interaméricaine sur
l'onchocercose, Antigua Guatemala (Guatemala)**

fi

Onchocerca volvulus

Colombie

Equateur

Guatemala

Mexique

