Module sur les maladies transmises par l'eau

pour l'équipe de l' Ethiopia n Health Center

en collaboration avec le Centre Carter (EPHTI)

et

les Ministères de l'Education et de la Santé

de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie

Melake Demena, Amare Workie, Eritrea Tadesse,

Seid Mohammed, Tamirat Gebru

Université d' Alemaya

2003

SOMMAIRE

PAGE

Table des matières i
Remerciements ii

CHAPITRE 1 Introduction
1.1 Objectif et utilisation des modules 1
1.2 Conseils d'utilisation des modules 1

CHAPITRE 2 Module central
2.1 Tests préliminaires et tests d'évaluation 3
2.2 Prévalence et brève description des maladies transmises par l'eau[1] 9
2.3 Objectifs pédagogiques 9
2.4 Activités pédagogiques 9
2.5 Définition 10
2.6 Epidémiologie 10
2.7 Etiologie 13
2.8 Pathogenèse et signes cliniques 14
2.9 Diagnostic 19
2.10 Prise en charge 20
2.11 Prévention et surveillance 20

CHAPITRE 3 Module satellite
3.1 Module satellite pour les agents de santé (AS) 22
3.2 Module satellite pour les infirmiers/infirmières de santé publique (ISP) 31
3.3 Module satellite pour les agents d'hygiène communautaire (AHC) 36
3.4 Module satellite pour les techniciens/nes de laboratoire (TL) 43
3.5 Module satellite pour les agents de santé communautaires (ASC) 52
3.6 Un message à l'attention du personnel soignant 60

CHAPITRE 4 Analyse des tâches des différentes catégories de personnel de l'équipe du Centre de Santé 62

CHAPITRE 5

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1. Objectif et utilisation de ce module

Dans les institutions éthiopiennes d'enseignement supérieur, le manque de matériel pédagogique et didactique adapté a constitué l'un des obstacles à une formation pratique et efficace.

techniciens/nes

9. Les zones de draconculose (ver de Guinée) endémique déjà identifiées en Ethiopie sont les suivantes :
    A. Régions de Gambella et Benshangul Gumuz
    B. Gambella et le sud de l'Omo
    C. Sud de l'Omo et zone d'Ogaden
    D. Régions de Gambella, sud de l'Omo et Afar

10. Laquelle des maladies citées ci-dessous ne fait pas partie du Programme national éthiopien d'éradication?

A. Choléra	B. Poliomyélite
C. Draconculose	D. A et C

11. Quelle est la cause la plus commune de diarrhée déshydratante grave des enfants de moins de 3 ans ?

A. Shigellose	B. Giardiase lamblia
C. Infection à rotavirus	D. Amibiase

12. La construction et l'utilisation correcte de latrines n'a aucune incidence sur :

A. Amibiase	B. Draconculose
C. Giardiase	D. Aucune des maladies ci-dessus

2.1.2 Chapitre II (Questions spécifiques aux différentes catégories de personnel de l'équipe du centre de santé)

A. Pour les agents de santé (health officers)

Choisir une lettre en réponse aux questions suivantes.

1. Kumsa, un garçon de 16 ans, présente sur [illegible]

B. Pour les infirmiers/infirmières en santé publique

Indiquer la lettre qui correspond à la réponse de votre choix.

1. Laquelle de ces maladies n'est pas liée à l'eau?
   - A. Amibiase
   - B. Shigellose
   - C. Poliomyélite
   - D. Hépatite B

2. Quel es le groupe le plus exposé aux maladies transmises par l'eau ?
   - A. Personnes âgées
   - B. Adolescents et adolescentes
   - C. Enfants de moins de cinq ans
   - D. Adultes

3. Laquelle de ces maladies apparaît fréquemment sous forme d'épidémie en Ethiopie?
   - A. Giardiase
   - B. Shigellose
   - C. Draconculose
   - D. Fièvre typhoïde

4. Quelle mesure est utilisée dans la prévention et la lutte contre les maladies liées à l'eau?
   - A. Elimination adéquate et dans le respect de l'hygiène des déchets humains
   - B. Protection de l'eau pendant son stockage à la maison et jusqu'à sa consommation
   - C. Traitement des vecteurs connus
   - D. Toutes les mesures ci-dessus

5. Quel est le médicament habituellement utilisé pour traiter l'amibiase ?
   - A. Ampicilline
   - B. Tétracycline
   - C. Métronidazole
   - D. Mébendazole

6. Quelles mesures comprend la prise en charge d'un(e) patient(e) atteint(e) de diarrhée ?
   - A. Maintien de l'équilibre hydro-électrolytique
   - B. Prévention de l'extension de l'infection
   - C. Réconfort et information du patient/de la patiente et de sa famille
   - D. Toutes les mesures ci-dessus

7. Les signes de déshydratation comprennent
   - A. Persistance du pli cutané
   - B. Baisse du 3(8 Tm (6(t)-1(et)-1( )-12 /P <</MCID 2)]TJ 0 T

2.2. Prévalence et brève description des maladies liées à l'eau

Les maladies transmises par l'eau constituent l'un des problèmes de santé majeurs de pays en développement tels que l'Ethiopie. Elles sont parmi les premières causes de morbidité et de mortalité de tous les groupes d'âge, et tout particulièrement des enfants de moins de cinq ans.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a calculé que les maladies diarrhéiques provoquent chaque année 3 millions de décès dans le monde (5).

Les maladies véhiculées par l'eau touchent tout particulièrement les lieux où l'hygiène générale et l'assainissement de l'environnement sont médiocres et où l'accès à une eau salubre est insuffisant (1, 5). On considère que 80% de toutes les maladies au monde sont dues à un assainissement inadapté, à la contamination des eaux ou au manque d'eau (Monica II, OMS). La pauvreté, l'analphabétisme, la promiscuité et l'insuffisance des services de santé sont des facteurs qui ont une incidence directe ou indirecte sur la prévalence des maladies transmises par l'eau. Il est donc nécessaire, pour faire face à ce problème considérable de santé publique, de mettre en œuvre une démarche intégrée de prévention et de prise en charge avec la participation de la communauté.

2.3. Objectifs pédagogiques

A l'issue de ce module, vous saurez

1. Définir les maladies véhiculées par l'eau ;
2. Décrire l'ampleur du problème des maladies liées à l'eau au plan national et mondial ;
3. Enumérer les différents agents responsables et décrire la pathogenèse des maladies transmises par l'eau les plus courantes ;
4. Décrire les signes cliniques et les méthodes de diagnostic des maladies courantes liées à l'eau ;
5. Décrire la prise en charge générale des maladies courantes transmises par l'eau ;
6. Indiquer les différentes mesures préventives et de lutte contre ces maladies.

2.4. Activité pédagogique 1

2.4.1 Etude de cas

Ibsa est un adolescent de 16 ans vivant dans la ville d'Alemaya, à 17km de Harar. Il habite avec toute sa famille dans une seule pièce. Sa famille vit de la culture et de la vente de khat. Ils n'ont pas de latrine et font leurs besoins dans les champs. Ils s'approvisionnent en eau dans un lac à quelques centaines de mètres de chez eux. Tous les habitants du voisinage utilisent l'eau du lac

pour son hygiène personnelle ou ses loisirs. Le problème se pose de façon particulièrement aigüe lorsque l'hygiène générale et l'assainissement de l'environnement sont médiocres et lorsque l'approvisionnement en eau salubre est insuffisant.

Les pays en développement supportent le lourd fardeau des maladies transmises par l'eau, les plus lourdes de conséquences étant les maladies diarrhéiques. Si tous les pays connaissent des cas de diarrhées, elles sont 5 à 6 fois plus fréquentes dans les pays en développement (OMS, 1987a). Le nombre annuel d'épisodes diarrhéiques dans le monde pourrait atteindre les 4 milliards (OMS, 1990a), tandis que plus de 3 millions de morts sont imputables chaque année aux maladies diarrhéiques.

Elles sont la première cause de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans. Dans les pays en développement, on estime la fréquence des diarrhées à 5 épisodes annuels par enfant de moins de 5 ans.

Ces jeunes enfants sont les plus menacés par les maladies hydriques car leur système immunitaire n'est pas encore tout à fait développé. En outre, leur résistance est souvent minée par la malnutrition.

En 1968, une épidémie de shigellose en Amérique Centrale a touché plus d'un demi-million de personnes et fait 20 000 victimes. Il y a quelques années, en Inde (Bengale Occidental), la shigelle a provoqué la morbidité et la mortalité de 350 000 et 3 800 personnes respectivement. La shigelle reste responsable d'interminables souffrances humaines au Bangladesh et dans d'autres pays asiatiques, latino-américains et africains.

L'Ethiopie, pays tropical en développement, est souvent confrontée à des épidémies de

Dans le monde entier, la giardiase affecte davantage les enfants que les adultes. Selon des recherches effectuées en Ethiopie, elle représente une prévalence de 2 à 11% dans certaines communautés vivant en altitude et chez les éleveurs nomades. Les zones urbaines comme Addis Abéba sont également affectées, avec une prévalence de 9% chez certains enfants (1, 13).

On estime le bilan de l'amibiase dans les régions tropicales et subtropicales du monde à 400 millions d'infections et 30 000 décès. Pour 1988-89, les rapports du ministère de la santé éthiopien sur les consultations externes indiquent près de 80 000 nouveaux cas d'amibiase. La prévalence la plus élevée d'amibiase en Ethiopie a été observée auprès des personnels manipulant la nourriture dans un hôpital d'Addis Abéba (82%) (1, 12).

La draconculose (infection du ver de Guinée ou filariose de Médine) est présente en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient. On estime à près de 20 millions le nombre de personnes qui en sont victimes dans le monde, mais son incidence mondiale accuse un déclin notable : elle a baissé de 21% pour la seule année 1994-1995. On ne trouve plus à l'heure actuelle de foyers actifs de la maladie qu'en Afrique sub-saharienne et au Yémen. L'Ethiopie figure dans la liste des pays endémiques pour cette maladie (8, 10). Selon le Programme éthiopien d'éradication de la draconculose (EDEP), les zones endémiques pour le ver de Guinée sont Gambella et le sud de l'Omo. Si le nombre de cas signalés en 1994 était de 1 252 cas, il était tombé à 46 seulement en 2002.

Le choléra, qui touche toutes les classes d'âge, est plus fréquemment observé chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes de 25 à 39 ans. Le choléra provoque chaque année 120 000 décès dans le monde ; il est particulièrement mortel en Afrique, où la fréquence et l'étendue des épidémies a augmenté depuis les années 1970. On estime à 79 millions le nombre de personnes actuellement menacées par l'infection du choléra en Afrique (9).

L'Escherichia Coli est une cause courante de diarrhée dans le monde et

Les entérovirus sont présents dans le monde entier. Ils sont particulièrement courants sous les tropiques et dans les zones socio-économiques défavorisées, surtout lorsque l'hygiène y est médiocre et que règne la promiscuité.

2.8.4. Gastroentérites bactériennes aigües (Escherichia coli)

Pathogenèse

- L'*E.coli* entérotoxique (ECET) provoque une diarrhée aqueuse en produisant une toxine bactérienne qui agit sur la partie supérieure de l'intestin grêle.
- L'E. coli invasive provoque une diarrhée inflammatoire en envahissant le côlon.

Signes cliniques

2.8.7. Poliomyélite

Pathogenèse

- Après ingestion, le virus de la polio infecte les cellules épithéliales du tube digestif avant de s'étendre au tissu lymphoïde, au sang et au système nerveux central.

Signes cliniques

- La période d'incubation pour la polio asymptomatique ou modérée est de 3 à 6 jours, et de 7 à 21 jours pour le développement de la polio paralysante.
- La plupart des infections sont asymptomatiques. Les patients présentent fièvre, malaises et pharyngite. Occasionnellement méningite aseptique, anorexie et maux de tête.
- La poliomyélite paralysante ne survient que chez moins de 1% des personnes infectées.

2.8.8. Gastroentérite virale aigüe (Rotavirus)

Pathogenèse

- Le virus infecte les cellules de l'intestin grêle, réduisant ainsi l'absorption des aliments et provoquant de la diarrhée.

Signes cliniques

- Période d'incubation de 2 à 4 jours.
- Vomissements soudains suivis d'une diarrhée modérée à grave.
- Selles généralement glaireuses.
- Déshydratation sévère fréquente.

2.8.9. Amibiase

Pathogenèse

- Les trophozoïtes s'accrochent à la muqueuse du côlon et aux cellules épithéliales et provoquent une ulcération de la muqueuse du caecum, du côlon pelvien et du rectum.
- L'infection intestinale provoque, rarement, la formation d'une lésion massive, ou granulome amibien.
- Les trophozoïtes envahissent parfois les veines pour atteindre le foie et y provoquer une hépatite suppurée.

Signes cliniques

- Période d'incubation variable, de 1 à 4 semaines en général, pouvant aller de quelques jours à des années.

2.9. Diagnostic

2.10. Prise en charge

La prise en charge générale des maladies liées à l'eau obéit aux principes suivants :

- ¾ Identification de l'organisme spécifique et mise en place d'un traitement adapté.
- ¾ Cependant, pour les patients/patientes présentant une diarrhée grave, la réhydratation hydro-électrolytique est obligatoire, avant même l'identification de l'organisme.
- ¾ L

viser toutes les situations rencontrées par l'ensemble de la communauté. Les points suivants devraient être abordés :

- Les agents étiologiques ;
- Le mode de transmission ;
- Les mesures de prévention et de surveillance médicale, et
- L'importance d'un traitement précoce.

Vous venez de terminer avec succès le module central. Vous lirez ensuite le module satellite correspondant à votre catégorie professionnelle. Les modules satellites sont organisés de la façon suivante :

3.1. Module satellite pour les agents de santé

3.2. Module satellite pour les infirmiers et infirmières de santé publique

3.3. Module satellite corcmitalire.

343.Module satellite et dee atr0 Td8d [(et)-1( )]TJ20.000 pttllire.

- Très rarement peut survenir un syndrome hémolytique urémique (SHU) qui se traduit par une insuffisance rénale aigüe, une anémie hémolytique et une thrombocytopénie.
- Une shigellose grave peut entraîner plus rarement une encéphalopathie toxique, un mégacôlon toxique avec perforation pouvant entraîner la mort (syndrome d'Ekiri).

¾ Diagnostic

- Les signes cliniques permettent de porter un diagnostic de présomption.
- Le diagnostic spécifique s'appuie sur une culture des shigelles E

Fièvre typhoïde

- **Pathogenèse**

  Après avoir été ingérés dans les aliments contaminés ou l'eau polluée, les germes pénètrent la barrière mucosique du côlon et de l'iléon distal, où se produit la multiplication intracellulaire.

Le *vibrio cholera* colonise l'intestin grêle et sécrète une entérotoxine qui

Escherichia coli

¾ Pathogenèse

Les microorganismes ingérés par voie oro-fécale commencent à se manifester après une période d'incubation de 1 à 12 jours. Les différentes espèces d'*E.coli* provoquent la diarrhée par différents mécanismes. La shigatoxine produite par l'*E.coli* cause une adhérence et un effacement de l'intestin provoquant de la diarrhée sanguinolente.

- L'*E.coli* entérotoxique provoque une diarrhée aqueuse en produisant une toxine bactérienne qui agit sur le haut de l'intestin grêle.
- L'*E.coli* invasive produit une réaction inflammatoire en envahissant le côlon et en provoquant une diarrhée sanguinolente.
- Les mécanismes par lesquels l'*E.coli* entéropathogène provoque une diarrhée aqueuse ne sont pas connus.

¾ Signes cliniques

Les signes cliniques d'une infection à l'*E.coli* comprennent :

- Malaises, anorexie et crampes abdominales.
- Apparition soudaine de diarrhée aqueuse, généralement modérée et passagère.
- Certaines espèces déclenchent une diarrhée sanguinolente et produisent une

- x Pas de maladie chronique du foie ou de porteurs sains.

¾ Signes cliniques

- x Période d'incubation de 14 à 60 jours (5 à 6 semaines en moyenne).
- x Les symptômes incluent anorexie, maux de tête, photophobie, pharyngite, toux.
- x Fièvre modérée (38-39^{o}C).
- x Un ictère peut apparaître au bout d'une à deux semaines.
- x Cas fulminants mortels dans 1 à 2% de tous les cas et 20 à 30% chez les femmes enceintes.

¾ Traitement

- x Pas de traitement spécifique

Poliomyélite

¾ Pathogenèse

Après ingestion, le poliovirus infecte les cellules épithéliales de la muqueuse intestinale et s'étend au tissu lymphoïde submuqueux où il se multiplie. Il envahit ensuite les ganglions lymphatiques locorégionaux et la circulation sanguine durant la virémie. On ne sait pas exactement comment le poliovirus atteint le système nerveux central, on pense que c'est au cours de la virémie ou par les nerfs périphériques.

¾ Signes cliniques

- x La plupart des infections sont asymptomatiques.
- x

iga v c atntrép-9(d 16 4.518)- 5.eœp.3 qpen1qudrf . 0f 2 Tc 0.07423 02e41(nd)]TJ ut

- Environ 90% des infections sont asymptomatiques tandis que 10% d'entre elles produisent une gamme de symptômes cliniques.
- Douleurs du bas de l'abdomen associées à une diarrhée modérée ou à des selles sanguinolentes se développant peu à peu.
- Granulome amibien et hépatite suppurée peuvent se produire, mais rarement.

¾ Diagnostic

- Mise en évidence microscopique des trophozoïtes ou des kystes dans les selles.

¾ Traitement

- Métronidazole 500mg 3 fois par jour pendant 5 à 10 jours.
- Tinidazole 2 grammes par jour pendant trois jours.

Giardiase

¾ Pathogenèse

Le trophozoïte de la Giardia adhère à l'épithélium mais n'en provoque ni l'invasion, ni la destruction. On connaît très mal le mécanisme par lequel la Giardia provoque une altération du petit intestin. L'infection peut être avortée, transitoire, récurrente ou chronique.

¾ Signes cliniques

- Période d'incubation de 1 à 4 semaines.
- La plupart des infections sont asymptomatiques.
- Parmi les premiers symptômes les plus notables : diarrhée, douleurs abdominales, nausée, vomissements, flatulences et selles nauséabondes.
- Les symptômes tendent à être intermittents mais récurrents, affaiblissant peu à peu le patient qui cumule une prise réduite de nutriments (anorexie) et la malabsorption.

¾ Diagnostic

- Identification des kystes ou des trophozoïtes dans les selles.

¾ Traitement

Les agents antimicrobiens comprennent :

- Métronidazole 250mg 3 fois par jour pendant 5 jours pour les adultes.
- Pour les enfants, 15mg/kg/jour divisés en 3 doses pendant 5 à 7 jours.
- Tinidazole 50mg/kg/par voie orale, dose unique (maximum 2 grammes), plus efficace que le métjours

Draconculose

Pathogenèse et signes cliniques ont été abordés dans le module central.

- Diagnostic
  - Clinique, fondé sur les conclusions établies à partir de l'émersion du ver adulte à travers la peau.
  - En laboratoire, par détection microscopique des larves après la rupture des cloques.
- Traitement
  - Traitement symptomatique des vers émergeant de la peau : emploi d'analgésique et de produits de traitement local de la blessure.
  - On considère que le niridazole, le thiabendazole et le mébendazole réduisent l'inflammation tissulaire et accélèrent peut-être le retrait du ver.
  - Métronidazole 250mg 3 fois par jour pendant 10 jours. Posologie pédiatrique, 25mg/kg/jour en 3 doses pendant 10 jours (sans dépasser les doses pour adulte).

Vous avez maintenant lu le module central et le module satellite. Il vous reste encore quelques activités à réaliser :

1. Lire l'analyse des tâches des différentes catégories au sein de l'équipe du centre de santé (Chapitre 4).
2. Répondre aux questions des tests préliminaires et tests d'évaluation.

   Important : Répondre sur une feuille à part
3. Comparer vos réponses aux tests préliminaires et d'évaluation avec les listes de réponses indiquées à l'Annexe XI et évaluer vos progrès.

3.2. Module satellite pour les infirmiers/infirmières de santé publique

3.2.1. Instructions d'utilisation de ce module

- Avant de lire ce module satellite, assurez-vous que vous avez bien répondu aux questions des tests préliminaires et étudié le module central.
- Lisez le module satellite suivant.
- Référez-vous au module central si nécessaire.
- Relisez l'histoire d'Ibsa et tentez de répondre aux questions.
- Evaluez-vous en répondant aux questions du test d'évaluation.

3.2.2. Objectif pédagogique

Objectif général:

Ce module est conçu pour doter l'apprenant(e) des connaissances et compétences nécessaires pour identifier et prendre en charge efficacement les maladies atteints de maladies liées à l'eau.

Objectifs spécifiques :

Après avoir lu ce module, vous devriez être en mesure de :

- Evaluer la situation d'un(e) patient(e) atteint(e) d'une maladie véhiculée par l'eau.
- Enumérer par ordre de priorité au moins 3 diagnostics infirmiers pour un(e) patient(e) atteint(e) de maladie véhiculée par l'eau.
- Citer au moins trois objectifs à atteindre dans le traitement des patient(e)s atteint(e)s de maladies transmises par l'eau.
- Enoncer 4 soins infirmiers à prodiguer à un(e) patient(e) atteint(e) de maladie liée à l'eau.
- Prendre en charge des patient(e)s atteint(e)s de maladie véhiculée par l'eau.

3.2.3. Activité No. 2

Après avoir lu les paragraphes 3.2.4 à 3.2.7, répondez aux questions sur l'étude de cas en faisant référence à l'histoire d'Ibsa.

3.2.4. Diagnostic infirmier

- Antécédents.
- Apparition et caractéristiques de la maladie.
- Thérapie médicamenteuse en cours.
- Apport alimentaire quotidien.
- Voyage récent dans une autre zone géographique.

Au cours de l'examen physique, l'infirmier/infirmière doit :

- Observer d'éventuels signes de déshydratation.
- Déterminer le degré de déshydratation.
- Inspecter la consistance, la couleur et l'odeur des selles.
- Noter le poids, les apports et les pertes quotidiens.

Sur la base de telles données d'évaluation, le diagnostic infirmier principal du patient/de la patiente pourra inclure :

- Diarrhée liée à l'ingestion d'eau contaminée ainsi qu'en témoigne le récit du/de la patient(e).
- Risque élevé de déficit hydrique en raison de la fréquence des selles molles.

- Anxiété liée à des excrétions fréquentes et incontrôlées.
- Risque élevé de lésion de la peau en raison de la fréquence des selles molles.
- Nutrition altérée, inférieure aux besoins du corps en raison de la diarrhée.
- Connaissance insuffisante des causes de la maladie et des mesures préventives par manque d'information.
- Risque élevé de propagation de l'infection.

3.2.5. But

- Maintenir l'équilibre hydro-électrolytique.
- Apaiser l'anxiété.
- Préserver l'intégrité de la peau.
- Maintenir une alimentation adéquate.
- Prévenir la propagation de l'infection.
- Fournir des informations sur les causes de la maladie et les mesures préventives.

3.2.6. Prise en charge

La prise en charge fondamentale d'un(e) patient(e) atteint(e) d'une maladie liée à l'eau consiste à identifier le microorganisme /germe spécifique l'affectant et à instaurer un traitement adapté.

- Le traitement complémentaire comprend
  - x en

- Le/la patient/e et sa famille ont besoin de conseils spécifiques en matière de régime alimentaire, repos et suivi.
- Le délire est fréquent dans la forme la plus grave de la fièvre typhoïde. Dans ce cas, le/la patient(e) a besoin d'un soutien spécial et sa sécurité doit être assurée par l'utilisation de traverses latérales et autres moyens de contention.
- On peut baigner le/la malade à l'éponge tiède lorsque sa température dépasse 40^0C.
- Guetter un éventuel globe vésical. e n 0 0 2 T c 0 .

- ¾ Pour les porteurs chroniques, ampicilline durant 4 à 6 semaines.

Choléra

- ¾ La pierre angulaire du traitement du choléra est la réhydratation hydro-électrolytique rapide et complète, orale ou intraveineuse.

Hépatite A

- ¾ Pas de thérapie spécifique. Soins complémentaires et repos sont fondamentaux dans la prise en charge.

Hépatite E

- ¾ Même chose que pour l'hépatite A

Poliomyélite

- ¾ Pas de thérapie spécifique.
- ¾ Le traitement symptomatique inclut l

Vous avez maintenant lu le module central et le module satellite. Il vous reste à réaliser les activités suivantes :

1. Lire au chapitre 4 l'analyse des tâches de chacune des catégories de personnel de l'équipe

Par conséquent, à l'issue de la lecture de ce module, les agents d'hygiène communautaire devraient être en mesure de :

- ¾ Décrire le mode de transmission des maladies transmises par l'eau.
- ¾ Enoncer les différentes activités de santé essentielles pour la prévention et la surveillance médicale des maladies véhiculées par l'eau.
- ¾ Décrire la contribution d'un comportement hygiénique à la prévention de la transmission de maladies liées à l'eau.

3.3.4. Mode de transmission

Les maladies hydriques sont transmises par l'eau contaminée par des déchets humains (excréments) contenant différents types d'agents pathogènes. Il est essentiel de connaître les modes de transmission de ces maladies pour mettre au point des mesures préventives et de surveillance.

Le travail des agents d'hygiène communautaire consiste à concevoir des moyens de briser la chaîne de transmission des maladies

3.3.5. Démarches de santé publique en matière de prévention et surveillance médicale des maladies transmises par l'eau

Les maladies transmises par l'eau constituent l'une des premières menaces contre la santé publique dans les pays en développement où l'on observe des points d'eau non salubre, des problèmes d'assainissement et des pratiques d'hygiène médiocres. La démarche de santé publique pour la prévention et la surveillance des maladies liées à l'eau devrait se fonder sur trois volets élémentaires :

- Assurer un approvisionnement adapté en eau salubre.
- Améliorer l'assainissement.
- Assurer un apprentissage de l'hygiène.

1. Assurer un approvisionnement adapté en eau salubre

Un approvisionnement adapté en eau salubre aura un effet positif sur la santé et le bien-être des personnes, de leur famille et de leur communauté. La salubrité de l'approvisionnement

a. Protection de l’eau aux points d’eau :

Les points d’eau tels que les sources, les ruisseaux et les puits doivent être protégés de toute contamination par :

- ¾ Une localisation adaptée : les points d’eau doivent se situer dans les lieux les plus élevés et à une distance adaptée (au moins 30 mètres) de sources de contamination telles que les latrines, fosses septiques, etc.
- ¾ La construction autour du point d’eau de barrières étanches à l’eau, par exemple protection autour d’une source.
- ¾ L’utilisation d’une pompe ou d’une corde et d’un système de seaux propres pour puiser l’eau de façon à réduire la contamination liée à des récipients souillés.
- ¾ Le creusement de fossw ( ).Tj 0 3 0 25 0 uTc -0.033 j -43.373 -14 Tw 1w 1 0 Td14 0.05 Twéduiene25

x

¾

Schéma 3.3.4: L'éducation à l'hygiène, une barrière contre les maladies véhiculées par l'eauIl est donc essentiel que les agents d'hygiène communautaire mettent l'accent sur les points suivants :

- ¾ Les agents responsables.
- ¾ Le mode de transmission.
- ¾ Le diagnostic précoce et la prise en charge des cas.
- ¾ La prévention et la surveillance médicale avec différents matériels pédagogiques comme les tableaux-papier, affiches, etc.

Une démarche intégrée autour de l'approvisionnement en eau salubre, l'amélioration de l'assainissement et l'apprentissage de l'hygiène (comme se laver les mains avec de l'eau et du savon) sont déterminants pour assurer le succès de la prévention et de la lutte contre les maladies véhiculées par l'eau.

Vous avez maintenant terminé la lecture du module central et des modules satellites. Il vous reste encore quelques tâches à accomplir :

1. Lisez l'analyse des tâches des différentes catégories de personnel de l'équipe du centre de santé au chapitre 4.
2. Reprenez les questions préliminaires en questions d'évaluation.
   (Attention, répondez sur une feuille à part.)
3. Comparez les réponses que vous avez données au test préliminaire et celles données au test d'évaluation avec les réponses indiquées à l'annexe XI, et évaluez vos progrès.

3.4. Module satellite pour les techniciens et techniciennes de laboratoire

3.4.1. Objectif du module

Ce module s'adresse aux techniciens et techniciennes de laboratoire et se propose de leur permettre de participer activement à la lutte en équipe contre les maladies transmises par l'eau à partir des recherches en laboratoire. Ce module devrait être utile à la fois pour les niveaux de formation initiale et pour la formation en cours d'emploi.

3.4.2. Instructions d'utilisation du module satellite

Avant de commencer ce module satellite, assurez-vous d'avoir terminé le module central et répondu aux questions préliminaires.

microscopiques d'identification de critères morphologiques, par la culture ainsi que par des tests biochimiques et sérologiques d'immunodiagnostic.

Une technique de prélèvement appropriée est essentielle si l'on veut obtenir les résultats escomptés en matière de diagnostic.

Prélèvement des échantillons de selles

La détection des parasites dans les selles dépend de leur prélèvement correct.

Procédure

Voici la procédure à suivre pour le prélèvement d'échantillons de selles :

- Fournir au patient/à la patiente des récipients à échantillon à couvercle hermétique et
- [illegible]

* **Quelques pratiques et gestes élémentaires à respecter (22)**

- ¾ Prévention des plaies punctiformes, coupures et écorchures et protection des blessures et lésions cutanées existantes, surfaces conjonctives et muqueuses.
- ¾ Application de mesures simples de protection afin de prévenir la contamination de la personne et de ses vêtements.
- ¾ Mesures d'hygiène élémentaire, dont le lavage régulier des mains au savon.
- ¾ Désinfection des surfaces pour éviter la contamination.
- ¾ Elimination en toute sécurité des déchets contaminés.

Règles de biosécurité (22)

- ¾ Porter des gants lorsque l'on manipule des matières infectieuses ou lorsqu'il existe un risque d'exposition au sang ou à d'autres échantillons.
- ¾ Jeter les gants dès qu'il y a le moindre soupçon de contamination ou de perforation, se laver les mains et mettre des gants neufs ou bien, si ce n'est pas possible, se laver les mains gantées dès qu'il y a eu contamination par un/des échantillon(s), puis de nouveau avant de prélever de nouveaux échantillons.
- ¾ Ne pas se toucher les yeux, le nez, ou toute autre partie exposée de la peau avec les mains gantées.
- ¾ Stériliser les objets non jetables.
- ¾ Lorsque l'autoclavage n'est pas possible, faire bouillir les instruments pendant au moins 30 minutes.

3.4.5.2. Recherches en laboratoire de certaines maladies spécifiques

Salmonellose

Les salmonelles ingérées sont souvent pathogènes pour les humains et les animaux

Morphologie et identification

- x Les salmonelles sont de taille variable ; la plupart d'entre elles sont mobiles grâce à leur flagelle péritriche.
- x Les salmonelles se développent rapidement sur une gélose simple mais ne fermentent presque jamais le lactose ou le sucrose.
- x Elles produisent de l'acide et parfois du gaz à partir du glucose et du mannose.
- x Elles produisent généralement du H_2S.
- x Elles survivent dans des eaux gelées pendant de longues périodes.

¾ **Examens à visée diagnostique effectués en laboratoire**

A. Echantillons :

- Coprocultures de selles fraîches, débris de mucus et frottis rectaux. Au microscope, on voit

A. Prélèvements :

On prélève des débris de mucus dans les selles afin de les mettre en culture

B. Frottis :

L'apparence au microscope des frottis réalisés à partir de prélèvements de selles n'est pas distinctive. La microscopie en champ sombre ou à contraste de phase peut mettre en évidence les vibrions qui se déplacent rapidement. On peut les reconnaître en microscopie en champ sombre à la façon caractéristique dont ils filent à toute vitesse et l'immobilisation de l'organisme est identifiable grâce à l'antisérum spécifique du sérogroupe 1 (21).

A. Examen microscopique des larves :

Matériels et méthodes :

ls ¾e

maladies transmises par l'eau. Ces informations les aident à prendre la mesure de leur rôle dans la détection de cas et la mise au point des procédures de gestion nécessaires à la prévention de ces maladies.

3.5.1.2. Comment utiliser ce module

- ¾ Commencer par le test préliminaire (Attention, répondre sur une feuille à part).
- ¾ Etudier le texte, y compris l'analyse des tâches.

3.5.2. Test préliminaire

Ecrire la lettre qui vous semble être la bonne réponse aux questions suivantes.

1. Toutes les maladies ci-dessous sont transmises par l'eau à l'exception de
   A. La fièvre typhoïde
   B. La draconculose (Infection du ver de Guinée)
   C. La tuberculose
   D. La poliomyélite

2. Les maladies véhiculées par l'eau affectent surtout
   A. Les adolescents et adolescentes
   B. Les enfants de moins de 5 ans
   C. Les hommes adultes
   D. Les femmes adultes

3. La draconculose (Ver de Guinée ou filariose de Médine) est transmise par voie orofécale
   A. Vrai
   B. Faux

4. Les maladies hydriques peuvent être transmises lorsque l'eau contamine
   A. Les mains et les ustensiles dont on se sert pour préparer les aliments
   B. Les aliments
   C. Les lieux de loisirs
   D. Dans tous les cas ci-dessus

5. La diarrhée est l'une des principales manifestations des maladies transmises par l'eau
   A. Vrai
   B. Faux

6. La déshydratation due à la diarrhée se manifeste par les signes suivants
   A. Globes oculaires enfoncés
   B. Fontanelles creusées
   C. Lèvres sèches
   D. Tous les signes ci-dessus

7. L'allaitement devrait être interrompu lorsqu'un enfant(e) souffre de diarrhée
   A. Vrai
   B. Faux

8. La vaccination constitue l'une des façons de prévenir et de combattre les maladies transmises par l'eau
   A. Vrai
   B. Faux

3.5.3. Objectif pédagogique

A l'issue de ce module, l'agent de santé communautaire sera en mesure de

1. Définir les maladies transmises par l'eau ;
2. Enumérer les maladies véhiculées par l'eau qui sont les plus fréquentes ;
3. Appréhender le problème des maladies liées à l'eau dans la communauté ;
4. Détecter et traiter les patients atteints de maladies

Les excréments ou l'urine d'une personne infectée peuvent contaminer les sources d'eau. Une personne saine attrape l'infection en

- Buvant directement de l'eau à une source contaminée ;
- Consommant des aliments préparés avec de l'eau contaminée ;
- Utilisant de l'eau contaminée pour son hygiène personnelle ;
- Utilisant de l'eau contaminée dans ses loisirs (par ex. en nageant)

Schéma 3.5.1: Transmission des maladies véhiculées par l’eau (sauf la draconculose)

Le mode de transmission

- ¾ Un ictère ou des urines foncées ;
- ¾ La paralysie des jambes (poliomyélite) ;
- ¾ Un ulcère dû à l'éclatement de cloques à la surface du corps, sur les jambes en général, et l'apparition par cette liaison du ver adulte de la draconculose.

3.5.9. Prise en charge

Les agents communautaires de santé doivent conseiller ou diriger les sujets présentant l'un ou l'autre des signes cliniques ci-dessus vers un centre de santé proche.

- ¾ Prise en charge de la diarrhée à la maison :
  - x Continuer l'alimentation, y compris l'allaitement maternel ;
  - x Donner davantage de liquide ;
  - x Vérifier les signes de déshydratation et consulter immédiatement.
- ¾ La thérapie par réhydratation orale (TRO) peut être utilisée sans risque et avec succès dans un grand nombre de cas de déshydratation.

3.5.10. Prévention et surveillance médicale

Les maladies transmises par l'eau peuvent être prévenues par :

1. Evacuation ou élimination, dans le respect des règles d'hygiène, des déchets humains et animaux :
   - ¾ Construction de latrines adaptées protégées des mouches ;
   - ¾ Utilisation des latrines dans le respect de l'hygiène ;
   - ¾ Éducation à la santé pour un changement des comportements et une amélioration de l'hygiène personnelle, par exemple par le lavage des mains à l'eau et au savon après la défécation ou avant la manipulation d'aliments, ainsi que l'évacuation des excréments dans le respect des règles d'hygiène.
2. Approvisionnement en eau de boisson potable :
   - ¾ Protection des sources publiques d'approvisionnement en eau telles que sources, puits et autres ;
   - ¾ Installation de tuyauteries pour acheminer l'eau depuis des sources protégées ;
   - ¾ Éducation à la santé de la population concernant :
     - x L'ébullition et le filtrage (tamisage) de l'eau de boisson.
     - x La collecte et le stockage dans les maisons dans le respect de l'hygiène ;
     - x La protection des points d'eau de la contamination par des personnes infectées par le ver de Guinée.

3. Détection précoce et prise en charge des cas :
    - ¾ Participation à la recherche active de cas ;
    - ¾ Participation à la notification et à la lutte contre les foyers épidémiques de maladies véhiculées par l'eau ;
    - ¾ Participation aux programmes d'éradication des maladies transmises par l'eau (comme la poliomyélite et le ver de Guinée).
4. Vaccination :
    - ¾ Les enfants doivent être vacciné(e)s dès leur naissance, puis à 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines et à 9 mois selon le programme de vaccination.

Vous avez maintenant terminé le module pour les agents communautaires de santé. Il reste encore à réaliser les activités ci-dessous :

1. Lire l'analyse des tâches des agents communautaires de santé qui suit.
2. Reprendre le test préliminaire et effectuer le test d'évaluation.
3. Comparer vos réponses au test préliminaire et au test d'évaluation avec les réponses qui suivent l'analyse des tâches.

3.5.11. Analyse des tâches des agents de santé communautaires

Tableau 3.5.1 : Objectifs et activités pédagogiques

Objectifs pédagogiques	Activités
Décrire les maladies véhiculées par l'eau	- Définir les maladies transmises par l'eau - Enumérer les maladies véhiculées par l'eau - Expliquer les modes de transmission
Expliquer les facteurs de risque environnementaux des maladies transmises par l'eau	- Enumérer les sources de contamination de l'eau - Décrire l'impact de mauvais systèmes d'évacuation des déchets sur la transmission des maladies liées à l'eau
Expliquer les principaux signes cliniques et la prise en charge des maladies véhiculées par l'eau	- Enumérer les signes et symptômes - Enoncer les conséquences de la diarrhée et les signes et symptômes de déshydratation - Expliquer la prise en charge de la déshydratation et le besoin de consultation immédiate
Identifier les mesures de prévention et de lutte	- Décrire la nécessité de disposer de systèmes adaptés pour l'évacuation des déchets - Décrire l'importance de la protection des sources d'approvisionnement en eau - Expliquer l'importance d'une manipulation adaptée de l'eau et de ses contenants

Tableau 3.5.2 : Objectifs en termes de comportements et activités pour les agents communautaires de santé

Objectifs pédagogiques	Activités
Comprendre que les maladies liées à l'eau constituent un problème de santé majeur	- Comprendre que les agents pathogènes sont la

Réponses aux questions du test préliminaire et d'évaluation des agents communautaires de santé

1.	C	2.	B
3.	B	4.	D
5.	A	6.	D
7.	B	8.	A

3.6. Un message à l'attention du personnel soignant

3.6.1. Un message à l'attention du personnel soignant

Définition

Les maladies transmises par l'eau résultent de la contamination de l'eau destinée à la consommation des ménages.

Comment l'eau est-elle contaminée?

L'eau destinée à la consommation des ménages peut être contaminée

- A la source (puits, sources, mares, rivières) par les déchets humains ou animaux, si les latrines ne sont pas utilisées de façon généralisée.
- Au cours du processus de
  - Puisage d'eau à une source protégée lorsque des récipients souillés sont utilisés ;
  - Stockage et utilisation de l'eau à la maison lorsque les récipients ne sont pas bien protégés ou couverts ;
  - Préparation des aliments ou des repas, lorsque les mains ne sont pas propres.

Prise en charge de la diarrhée à la maison

La diarrhée est la manifestation la plus courante et dangereuse des maladies véhiculées par l'eau, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans.

Une mère dont l'enfant a de la diarrhée devrait

- Donner davantage de liquide à son enfant qui souffre de diarrhée :
  - Lui donner de l'eau, une solution de sels de réhydratation orale (SRO) ou des boissons ou liquides disponibles localement, tels que soupes, eau de riz ou jus

- Si l’enfant a 6 mois ou plus et ne tè

CHAPITRE QUATRE

ANALYSE DES TACHES POUR LES DIFFERENTS MEMBRES DE L'EQUIPE DU CENTRE DE SANTE

Tableau 4.1 : Connaissance – Objectifs et activités

Objectifs pédagogiques	Activités pédagogiques			
	Agents de santé	Infirmiers/infirmières de santé publique	Agents d'hygiène communautaire	Techniciens/Techniciennes de laboratoire

Connaissance - Objectifs et activités (suite)

Objectifs pédagogiques	Activités pédagogiques			
	Agents de santé	**Infirmiers/infirmières de santé publique**	**Agents d'hygiène communautaire**	**Techniciens/Techniciennes de laboratoire**
Expliquer les signes				

Tableau 4.2 : Attitude – Objectifs et activités

Objectif pédagogique	Activités pédagogiques			
	Agents de santé	**Infirmiers/infirmières de santé publique**	**Agents d'hygiène communautaire**	**Techniciens/Techniciennes de laboratoire**
Considérer les maladies transmises par l'eau comme un problème majeur de santé publique	- Mettre l'accent sur . diagnostic et traitement . prévention et surveillance médicale - Être convaincu(e) de l'importance de l'éducation à la santé	- Être convaincu(e) de l'importance de . diagnostic et traitement adaptés . prévention et surveillance médicale . mettre l'accent sur l'éducation à la santé	- Être convaincu(e) de l'importance de . prévention et surveillance médicale . diagnostic et traitement . éducation à la santé	- Être convaincu(e) de l'importance de . diagnostic et prise en charge . prévention et surveillance médicale. . éducation à la santé
Tenir compte de l'importance du diagnostic clinique et de la prise en charge des maladies liées à l'eau	- Mettre l'accent sur l'évaluation clinique des maladies liées à l'eau, en particulier sur la diarrhée - Mettre en place une prise en charge appropriée	- Mettre l'accent sur la prise en charge de la diarrhée	- Mettre l'accent sur le diagnostic précoce et la prise en charge de la diarrhée	- Mettre l'accent sur la réaction rapide au diagnostic de laboratoire sur la diarrhée
Apprécier les masures préventives et de lutte contre les maladies liées à l'eau	- Souligner : . les facteurs de risque . le mode de transmission . les besoins de prévention et de surveillance médicale des maladies transmises par l'eau	- Souligner : . les facteurs de risque . les modes de transmission . les besoins de prévention et de surveillance médicale des maladies liées à l'eau	- Souligner : . les facteurs de risque et les modes de transmission - le besoin de protection et de contrôle des sources d'eau - le besoin de systèmes d'évacuation des excréments respectant l'hygiène . éducation à la santé	- Souligner : . les facteurs de risque et les modes de transmission . le besoin de prévention et de surveillance médicale des maladies transmises par l'eau

Tableau 4.3 : Entraînement - Objectifs et activités

Objectifs pédagogiques	Activités pédagogiques			
	Agents de santé	**Infirmiers/infirmières de santé publique**	**Agents d'hygiène communautaire**	**Techniciens/Techniciennes de laboratoire**
Identifier un cas de maladie transmise par l'eau	- Obtenir les informations pertinentes sur les antécédents et réaliser l'examen physique - Demander les tests de laboratoire pertinents pour toute maladie liée à l'eau	- Evaluer les signes et les symptômes . évaluer les signes vitaux . évaluer une éventuelle déshydratation et/ou malnutrition	- Interroger sur les signes et les symptômes - Evaluer les facteurs de risque environnementaux -	

CHAPITRE CINQ

GLOSSAIRE

Bradycardie	Pouls anormalement lent, moins de 60 pulsations par minute
Cholécystite	Inflammation de la vésicule biliaire
Déshydratation	Perte de grosses quantités d'eau et d'électrolytes du corps
Epidémie	Survenue d'une maladie à une fréquence excédant la présence constante (habituelle) de cette maladie dans une zone géographique donnée
Epidémiologie	Etude de la distribution et des déterminants de la fréquence d'une maladie parmi une population
Epistaxis	Saignement du nez
Hépatomégalie	Augmentation anormale du volume du foie
Période d'incubation	Temps qui sépare l'entrée d'un microorganisme dans le corps et l'apparition des symptômes de la maladie
Mortalité	Mort

Pat 0 2Dgit n(é)0st 7(0.004 T325 Ta2(v)4b-0.004 Tw -9.253c)3(uoDC apop)73 092 /P <</MCIs.004 no64 56>B

25. Zeleke W/Tensay and Aschalew Mengistu, Indigenous weaning foods: Hygiene and diarrheal diseases in rural Ethiopian setting, Jimma Zone. Eth. J. health Development Vol. 11, No. 2 August 1997, pp. 149- 156.

26. G. Mitike; Prevalence of Acute and Persistent Diarrhea in North Gondar Zone, Ethiopie; East African Medical Journal; Vol 78. No. 8, 433 – 437, 2001.

27. Bogale Worku, thyphoid fever in an Ethiopian children's hospital 1984 - 1995. Ethiop J. Health Dev., 2000: 14(3) 311-315.

28. A. Aseffa, viral diseases in Ethiopia. East African Medical Journal, 1993: 70 (10) 624 – 626.

29. MOH, Guidelines for the prevention and control of selected Epidemic Diseases in Ethiopia.

CHAPITRE SEPT

ANNEXES

7.1. Examen direct de prélèvement de selles

Examen direct d'un prélèvement de selles avec une solution physiologique saline et une solution iodée de Dobell.

Matériel et méthodes

- Bâtonnets applicateurs en bois
- Lames porte-objet (microscope)
- Lames couvre-objet (microscope)
- Flacons compte-gouttes contenant du sérum physiologique (0,85% pds/vol.) et une solution iodée de Dobell
- Microscope
- Pipette de Pasteur

Procédure

1. Placer une goutte de sérum physiologique au centre de la partie gauche de la lame et une goutte de solution iodée de Dobell au centre de la partie droite de la lame.
2. Avec un bâtonnet applicateur, prélever une petite portion de selles (environ 2 mg, soit à peu près la taille d'une tête d'allumette) et la placer sur 12(nt)-1(r)T5 Tc 0 Tw 2.181e

7.2. Cycle de vie de l'Entamoeba hystolicica

Cycle de vie de l'*M47[-11*

7.3. Cycle de vie de la Giardia lamblia



Cycle de vie de la *Giardia lamblia*.

1. Kyste hors du corps après évacuation dans les selles.
2. Trophozoïte formé dans l'intestin après l'ingestion du kyste.
3. Kyste formé dans l'intestin.
4. Kyste excrété dans les selles.

Source : Shibiru Tedla; Introduction to Parasitology, AAU Press, 1986.

7.4. Cycle de vie du Dracunculus medinensis



Cycle de vie du *Dracunculus medinensis*.

1. Les femelles adultes libèrent les larves dans l'eau par les cloques présentes à la surface des tissus.
2. Les larves se développent dans les cyclopes > formes infectantes.
3. Parasite adulte chez l'humain infecté par l'ingestion de cyclopes contenant des larves infectantes.

Source : Shibiru Tedla; Introduction to parasitology, AAU Press, 1986.

TT1t <</A12/Foot12tom]04.84Box [7 EMC ( )2 0 Td ( )2Figu0.56e <</M[(.5)-2(.)]TJ 1.39e <</M[(Illu)3(s)-2(t)5(r)1(a)-2(t)5(io)3(n)]TJ ET /Figu5.12/Fo9no . EMC (27e

7.6. Illustration d’une pratique communautaire insalubre autour d’une source d’approvisionnement en eau

7.7. Illustration d’une pratique insalubre de puisage de l’eau à une mare

Puiser de l’eau à une mare comme celle-ci et la boire peut favoriser la propagation de la maladie.

Source : Shibiru Tedla; Introduction to parasitology, AAU Press, 1986.

7.8. Tableaux

Tableau 7.8.1 : Quelques caractéristiques des bactéries qui causent les maladies transmises par l'eau

Organisme	Forme	Taille	Réaction gram	Exigence atmosphérique	Caractéristiques de fermentation	Motilité
V. Cholera	Bâtonnets	3.4 x 0.5 µm	Gram négatif	Aérobique	fermente le sucrose	Hautement motile
Shigellae	Bâtonnets	2.4 x 0.6 µm	Gram négatif	Anaérobique facultatif	ne fermente pas le lactose	Non motile
Salmonella	Bâtonnets	2.4 x 0.6 µm	Gram négatif	Aérobique et anaérobique facultatif	ne fermente pas le lactose	Motile
E.coli	Bâtonnets	-	Gram négatif	Aérobique et anaérobique facultatif	fermente le lactose	Motile

Tableau 7.8.2 : Caractéristiques morphologiques de parasites responsables de maladies liées à l'eau

Organisme (parasite)	**Morphologie**	
	Trophozoïte	**Kyste**
Entamoeba Histolytica	- Taille moyenne 25-20 µm - Mouvement améboïde actif - Les spécimens dysentériques contiennent	

Tableau 7.8.3: Options de prise en charge et posologie des traitements pour les maladies liées à l'eau

Maladie	Médicament	Posologie adulte	Posologie pédiatrique	Remarques particulières
Typhoïde	Chloramphénicol	50mg/kg/jour en IV en 4 fois (toutes les 6 heures, max. 4 grammes /jour)	50 – 75mg/kg/jour en IV, en 4 fois (toutes les 6 heures, max. 4 grammes /jour)	Eviter si le/la patient/e présente un déficit en G6PD
	Triméthoprim - Sulfaméthoxazole	1 cachet double effet voie orale 2 fois/ jour	15-20mg/jour TMP/kg/jour voie orale/IV en 2 prises (1 toutes les 12 heures)	Eviter si le/la patient/e présente un déficit en G6PD
	Céfrixone	1-2 grammes en IV/IM en 1 ou 2 fois, toutes les 12-24 heures (max. 4 grammes/jour)	50-100mg/kg/jour en IV/IM en 1 ou 2 fois (toutes les 12-24 heures, max. 4 grammes/jour)	
	Amoxicilline	250-500mg voie orale 3 fois/jour	20-80mg/kg/jour voie orale en 2-3 fois/jour (max. 2-3 grammes / jour)	

/jour

Tableau 7.8.3 Suite

7.9. Réponses aux questions du test préliminaire et du test d'évaluation

Chapitre I : Réponses aux questions destinées à toutes les catégories de personnel du centre de santé

1. Les maladies véhiculées par l'eau sont des maladies virales, bactériennes et parasitaires dont l'eau est le moyen commun de transmission.

2. A) 1. Fièvre typhoïde, 2. Shigellose 3. Choléra
   B) 1. Hépatite infectieuse 2. Poliomyélite 3. Gastroentérite
   C) 1. Amibiase 2. Giardiase 3. Draconculose

3.	Vrai	4.	Faux	5.	Vrai	6.	Vrai
7.	B	8.	B	9.	B	10.	A
11.	C	12.	B				

A. Réponses aux questions destinées aux agents de santé (Health Officers)

1.	A	2.	D	3.	A	4.	C
5.	B	6.	C	7.	B	8.	B
9.	B	10.	A				

B. Réponses aux questions destinées aux infirmiers/infirmières de santé publique (Public Health Nurses)

1.	D	2.	C	3.	B	4.	D
5.	C	6.	D	7.	D	8.	B

C. Réponses aux questions destinées aux agents d'hygiène communautaire (Environmental Health Technicians)

1.	C	2.	D	3.	C	4.	A
5.	D	6.	Plus bas que la source d'eau				
7.	1. Faire bouillir	2. Désinfecter		3. Filtrer		4. Stocker	

D. Réponses aux questions destinées aux technicien(ne)s de laboratoire (Medical laboratory Technicians)

1.	D	2.	D	3.	A	4.	C
5.	C						

6 re W n BT /TT2 1 T 9.96 0 0 9..